

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **NEUROMULTIVIT**

potahované tablety

Thiamini hydrochloridum

Pyridoxini hydrochloridum

Cyanocobalaminum

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

**Co naleznete v této příbalové informaci:**

1. Co je přípravek Neuromultivit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neuromultivit užívat
3. Jak se přípravek Neuromultivit užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Neuromultivit uchovávat
6. Obsah balení a další informace

### **1. CO JE PŘÍPRAVEK NEUROMULTIVIT A K ČEMU SE UŽÍVÁ**

Přípravek Neuromultivit obsahuje vitamín B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> a B<sub>12</sub>, které jsou nezbytné pro správnou funkci nervové soustavy.

Přípravek Neuromultivit je určen jako doplňková léčba různých neurologických obtíží, které se projevují záněty nebo bolestivostí v průběhu nervu nebo jeho obrnou.

Přípravek je určen pro dospělé.

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NEUROMULTIVIT UŽÍVAT**

**Neužívejte přípravek Neuromultivit**

- jestliže jste **alergický(á)** na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

**Děti a dospívající**

Přípravek není určen pro děti a dospívající.

**Další léčivé přípravky a přípravek Neuromultivit**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Neuromultivit může snižovat účinek současně užívané L-dopy.

**Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy.

### 3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEUROMULTIVIT UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování vždy určí lékař. Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 3krát denně 1 tabletu. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Tablety se užívají maximálně 4 týdny. Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.

#### **Jestliže jste užil(a) více přípravku Neuromultivit, než jste měl(a)**

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet Neuromultivitu, kontaktujte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

#### **Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:**

##### **Vzácné (1 – 10 pacientů z 10 000)**

- Celkové poruchy: bolest hlavy, závrať.
- Gastrointestinální trakt: nevolnost.

##### **Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000 pacientů)**

- Imunitní systém: reakce přecitlivělosti, nejčastěji se projevující kožní vyrážkou.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek). Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### 5. JAK PŘÍPRAVEK NEUROMULTIVIT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

### 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

#### **Co přípravek Neuromultivit obsahuje**

Léčivými látkami jsou:

Thiamini hydrochloridum (vitamín B<sub>1</sub>) 100 mg,

Pyridoxini hydrochloridum (vitamín B<sub>6</sub>) 200 mg,  
Cyanocobalaminum (vitamín B<sub>12</sub>) 0,2 mg v 1 potahované tabletě.

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, povidon, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, hypromelosa, polyakrylátová disperze 30%.

**Jak přípravek Neuromultivit vypadá a co obsahuje toto balení**

Neuromultivit jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.

Velikost balení: 20 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.4.2014.**