

## OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OBALU

Štítek na PE lahvičce (1x100 g)

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

##### **PEROXID VODÍKU 3% TMD**

Kožní sprej, roztok

Hydrogenii peroxidum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

100 g roztoku obsahuje hydrogenii peroxidum 30% – 11,2 g.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina benzoová, difosforečnan sodný a čištěná voda.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok

100 g

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ke kožnímu podání jako kožní antiseptikum při drobných poraněních. K vyčištění a deodoraci hnisajících ran a kožních vředů.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužívejte vnitřně nebo k ošetření hlubokých ran! Chraňte před vniknutím do očí (poškozuje oční rohovku již ve velmi nízké koncentraci). Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou. Možnost alergické kožní reakce, zejména na kyselinu benzoovou. Redukční činidla, alkálie, jodidy, kovy a manganistany mohou rušit účinky přípravku.

#### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika.

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Registrační číslo: 32/301/02-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Číslo šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Přípravek použijte co nejdříve od vzniku poranění. Povrchovou ránu opláchněte dostatečným množstvím roztoku opakovaným stlačením mechanického rozprašovače. Ošetření povrchové rány v okolí očí proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali. Při větším poranění nebo pokud se poranění nehojí nebo se zhoršují příznaky infekce, vyhledejte lékařské ošetření.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

peroxid vodíku 3% tmd