

Příbalová informace – VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Pinosol

nosní kapky

Držitel rozhodnutí o registraci

ZENTIVA, a.s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Léčivé látky:

Pini etheroleum 0,3752 g , Menthae piperitae etheroleum 0,1000 g, Eucalypti etheroleum 0,0500 g, Thymolum 0,0032 g, Guaiazulenum 0,0020 g, Tocoferolum alfa acetat 0,1700 g v 10 g roztoku,

1 ml přípravku = 25 kapek

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol, Glyceromakrogol - 250 – trioleát, rostlinný olej

Indikační skupina

otorinolaryngologikum, fytofarmakum

Charakteristika

Směs éterických olejů a čistých přírodních látek s protimikrobiálním účinkem v rostlinném oleji. Zlepšuje prokrvení sliznice a obnovuje její přirozené funkce.

Indikace

Přípravek se používá k léčbě rýmy a dalších zánětlivých onemocnění sliznice nosu, nosohltanu a u pacientů po chirurgických výkonech v nosní dutině.

Inhalace účinných látek může příznivě ovlivnit infekční zánětlivé onemocnění dýchacích cest (záněty hrtanu, průdušnice a průdušek).

Bez předcházejícího lékařského doporučení se může přípravek používat jen u nekomplikované rýmy.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

Přípravek mohou užívat těhotné a kojící ženy.

Kontraindikace

Pinosol se nesmí používat při přecitlivělosti na přípravek a při zánětech nosní sliznice na alergickém podkladu.

Přípravek se nesmí podávat dětem do 1 roku.

Dětem od 1 do 2 let může být přípravek podáván jen při dodržení správného způsobu podání (přípravek je nutno rozetřít po nosní sliznici vatovým tamponem a event. krátce zatlačit na nosní křídla.).

Nežádoucí účinky

Během podávání přípravku se může v ojedinělých případech vyskytnout svědění nebo pálení sliznice nosní dutiny.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poradte s lékařem.

Interakce

Interakce nejsou známy.

Dávkování a způsob použití

Dospělí užívají několikrát denně 2-3 kapky přípravku (nakapat do obou nosních dírek), nejdříve v hodinových intervalech, později v delších časových intervalech.

Při inhalaci inhalačními přístroji se vlijí 2 ml přípravku do 1 litru horké vody. Inhalace se provádí 2 krát denně.

Dětem od 1 roku se aplikují 1-2 kapky 3-4x denně.

U dětí ve věku 1-2 let se k aplikaci používá vatový tampon (tyčinka na konci obalená chumáčkem vaty), kterým se rozetře přípravek po nosní sliznici.

Obvyklá doba používání je 5 (3-7) dnů

Upozornění

O vhodnosti současného užívání přípravku Pinosol s jinými léky se poradte s lékařem.

U dětí do 2 let existuje určitá (spíše teoretická) možnost zanesení přípravku do dýchacích cest (hrtan, průdušnice, průdušky) důsledkem prudkého vdechu.

Nezlepší-li se příznaky onemocnění během užívání přípravku, nebo se dokonce zhorší, vyhledejte lékaře.

Předávkování

Předávkování přípravkem je málo pravděpodobné. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poradte s lékařem.

Uchovávání

Přípravek uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu a v krabičce při teplotě do 25 °C, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem

Varování

Přípravek neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení

10 ml

Datum poslední revize

1.6.2014