

sp.zn. sukls95268/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně!

SEPTOFORT 2 mg

(Chlorhexidini digluconas)

pastilky

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE:

WALMARK a.s., Třinec, Česká republika

SLOŽENÍ:

Léčivá látka: Chlorhexidini digluconas (ut Chlorhexidini digluconatis solutio 20% 10 mg) 2 mg v jedné pastilce.

Pomocné látky: Sorbitol, aroma máty peprné, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, zeleň složená 600938, aspartam.

INDIKAČNÍ SKUPINA:

Otorhinolaryngologicum

CHARAKTERISTIKA:

Pastilky s příchutí máty na desinfekci dutiny ústní a krku. Přípravek neobsahuje cukr, je vhodný i pro diabetiky.

INDIKACE:

Přípravek je určen k prevenci a lokální léčbě infekcí dutiny ústní a horních cest dýchacích (afty, záněty dásní, jazyka, nosohltanu, stavy po operacích v dutině ústní nebo krku, po extrakcích zubů, eroze ústní sliznice různého původu apod.) Přípravek mohou užívat děti od 5 let, mladiství i dospělí.

KONTRAINDIKACE:

Přípravek nesmí užívat nemocní přecitlivělí na chlorhexidin, sorbitol, aspartam nebo nemocní s fenylketonurií. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení ošetřujícího lékaře. Nepodávat dětem do 5 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Při delším užívání přípravku se může ojediněle vyskytnout přechodné žlutohnědé zbarvení zubního povrchu a jazyka, dočasná porucha chuti a pálení jazyka, které po vysazení léku vymizí.

U osob citlivých na sorbit se může objevit průjem, který po vysazení přípravku odezní.

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušete užívání přípravku a poradte se s lékařem.

Přecitlivělost na přípravek se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje s poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušete užívání přípravku a vyhledejte lékaře!

INTERAKCE:

Účinky chlorhexidinu a látek obsažených v zubních pastách se mohou vzájemně rušit a proto je třeba používat zubní pasty a Septofort 2 mg s časovým odstupem. Jiné interakce nejsou známy.

DÁVKOVÁNÍ:

Neurčí-li lékař jinak užívají dospělí 3krát denně 1 pastilku po jídle. Pastilky se nechají volně rozplynout v ústech. Dětem od 5 do 12 let se podává 2krát denně 1/2 až 1 pastilka. Dětem od 12 let a mladistvým se podává 3krát denně 1 pastilka. Po užití pastilky se nesmí jíst a pít asi 1 až 2 hodiny.

Stejně jako jídlo i zubní pasty mohou rušit účinek léku, proto mezi užitím pastilky a čištěním zubů musí uplynout nejméně půl hodiny. Po zmírnění obtíží je nutné užívat pastilky ještě 2 až 3 dny.

UPOZORNĚNÍ:

O vhodnosti současného užívání přípravku Septofort 2 mg s jinými léky se poraďte s lékařem. Pokud do 3 dnů nenastane výrazné zlepšení, nebo dojde-li dokonce ke zhoršení stavu, vyhledejte lékaře. U dětí s horečkou se vždy poraďte s lékařem již na počátku obtíží. Přípravek nepodávejte dětem do 5 let pro nebezpečí vdechnutí pastilky. Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte po uplynutí doby vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ:

12, 24 nebo 36 pastilek

DATUM POSLEDNÍ REVIZE:

19.6.2013